受験番号						
------	--	--	--	--	--	--

理 科(化 学) (解答用紙5枚中 その1)

得点	

1

(1)

ア	イ	ウ
質量モル濃度	下がり	上がり
エ	オ	カ
(スクロース)水溶液	モル濃度	ファントホッフ

(2)

計算	塩化カルシウムの式量は 111 g/mol なので, $(11.1 / 111) \div 0.500 = 0.20 \text{ mol/kg}$	答	0.20 mol/kg

(3)

(4)

溶液を冷却すると溶媒の水だけが凝固し、残った溶液の濃度が上昇し、凝固点降下度が大きくなるため。

(5)

①	計算	(2)より、塩化カルシウムの質量モル濃度は 0.20 mol/kg 塩化カルシウムは完全電離しているため、溶質の総濃度は 0.60 mol/kg 凝固点降下度は $1.85 \times 0.6 = 1.11 \approx 1.1$ 凝固点は $0 - 1.1 = -1.1$	答	-1.1 (°C)
②	計算	塩化ナトリウムの式量は 58.5 g/mol 塩化ナトリウムは完全電離するので、溶液の溶質の物質量は、 $(9 / 58.5) \times 2$ 浸透圧は $\pi = (9 / 58.5) \times 2 \times 8.3 \times 10^3 \times (273 + 37)$ $= 7.91 \times 10^5 \approx 7.9 \times 10^5$	答	$7.9 \times 10^5 \text{ (Pa)}$

受験番号					
------	--	--	--	--	--

理 科(化 学) (解答用紙5枚中 その2)

得点	

2

(1)

①	計算	エンタルピー変化は $\Delta H = \{-75 + (-286) \times 2\} - (-394) = -253 \text{ kJ}$	答	253 (kJ)
		(別解) 各物質の生成熱より $\{75 + (286) \times 2\} - (394) = 253 \text{ kJ}$		
②	発熱反応			
③	$\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_4 + 2\text{O}_2$			
④	計算	1時間4分20秒は3860秒である。 5.00 Aで3860秒間通電すると $5.00 \times 3860 \div (9.65 \times 10^4) = 0.20 \text{ mol}$ の電子が流れる。 8電子で1分子のメタンが生成するため、 $0.20 \div 8 = 0.025 \text{ mol}$ のメタンが生成する。		
		答	$2.5 \times 10^{-2} \text{ (mol)}$	

(2)

①	ア	$1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$	イ	$5.0 \times 10^{-9} \text{ (mol/L)}^2$
	ウ	大きい	エ	生じる
②	計算	元の Ag^+ の濃度を x とする。 混合後の濃度はそれぞれ、 $[\text{Ag}^+] = x \times (10/20) = x/2 \text{ mol/L}$, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 7.2 \times 10^{-4} \times (10/20) = 3.6 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ したがって、 $[\text{Ag}^+]^2 [\text{CrO}_4^{2-}] = (x/2)^2 \times 3.6 \times 10^{-4} > 3.6 \times 10^{-12} \text{ (mol/L)}^3$ $x^2 > 4.0 \times 10^{-8}$ $x > 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$		
		答	$2.0 \times 10^{-4} \text{ (mol/L)}$	

受験番号							
------	--	--	--	--	--	--	--

理 科(化 学) (解答用紙5枚中 その3)

得点	

3

(1)

ア	イ	ウ
7	酸	下方置換
エ	オ	カ
次亜塩素酸	次亜塩素酸ナトリウム	強い

(2)

(a)	$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$
(b)	$\text{NaClO} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
(c)	$\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \longrightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$
(d)	$\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \longrightarrow 2\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$

(3)

①	青(紫)色	
②	計 算	<p>反応(c)と(d)より, 1 mol の Cl_2 あたり 2 mol の $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ が必要。</p> <p>KI 水溶液に通じた Cl_2 の物質量は, $0.01 \times (5/1000) \div 2 = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}$</p> <p>$\text{Cl}_2$ の分子量は 71 g/mol なので</p> <p>$71 \times 2.5 \times 10^{-5} \approx 1.8 \times 10^{-3} \text{ g}$</p>
	答	1.8 (mg)
③	変わらない	
④	少なくなる	

(4)

B, D

受験番号							
------	--	--	--	--	--	--	--

理 科(化 学) (解答用紙5枚中 その4)

得点	

4

(1)

A	$\text{HC}\equiv\text{CH}$	B	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$	C
D	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	E

(2)

A	アルキン	B	ケトン	C	アミン
D	アルコール	E	酸無水物	F	エステル

(3)

A	キ	B	エ	C	ウ	D	カ	E	ク	F	イ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(4)

①
②	7

受験番号							
------	--	--	--	--	--	--	--

理 科(化 学) (解答用紙5枚中 その5)

得点	

5

(1)

①	ウ	②	ア	③	イ	④	ウ	⑤	イ	⑥	イ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(2)

(a)	凝析	(b)	熱可塑性
-----	----	-----	------

(3)

A	$\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 \quad \text{H}_2\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CH}_3 \end{array} \right]_n$	B	$\left[\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{Si}-\text{O} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_n$
---	---	---	--

(4)

二	重	結	合	が	あ	る	と	光	や	酸	素	で	酸	化
さ	れ	ゴ	ム	の	分	子	構	造	が	壊	れ	る	か	ら

(5)

計 算	<p>ブタジエンがスチレンの n 倍あるとし, SBR には平均 m 個のスチレンが重合しているとする, 分子量は $(104 + 54n)m$ となる。この SBR 一分子あたりに付加する水素の物質量は $n \times m \text{ mol}$ となる。</p> <p>よって, $133 \div (104 + 54n)m \times nm = 3.0 \div 2$ となり, これを解くと $n = 3.0$。 (別解あり)</p>	答	3.0 (倍)
--------	---	---	---------